

Άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Άρθρο 35 του ν.3794/09, ΦΕΚ 156-Α'/04.09.09

- Τυφλοί
- Με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%)
- κωφάλαλοι
- πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
- πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (stunt) συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης,
- πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne
- πάσχοντες από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους
- πάσχοντες από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λευκώματα, συμπαγείς όγκους)
- πάσχοντες από το σύνδρομο του Bund Chiari
- πάσχοντες από τη νόσο του Fabry
- πάσχοντες από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων)
- πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκα
- πάσχοντες από βαριά μυασθένεια, θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή
- οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
- πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση – αιμορροφιλίες και οι υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως
- οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνας, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου
- πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1
- πάσχοντες από σύνδρομο Evans,
- οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία
- οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%
- πάσχοντες από φαινυλκετονουρία
- πάσχοντες από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου
- πάσχοντες από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή
- πάσχοντες από τη νόσο του GAUCHER
- πάσχοντες από συμπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη με πνευμονική υπέρταση άνω των 50mm Hg
- πάσχοντες από από μονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό κορμό, από παθήσεις του μυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης <35%)
- πάσχοντες από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια
- πάσχοντες από πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση
- πάσχοντες από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας

- πάσχοντες από το σύνδρομο Brugada
- πάσχοντες από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή
- πάσχοντες από γλυκογονιάσεις
- πάσχοντες από κίρρωση ήπατος
- πάσχοντες από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας
- πάσχοντες από τη νόσο του Crohn
- πάσχοντες από τη νόσο Wilson
- πάσχοντες από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchhausen)
- πάσχοντες από πολλαπλούν μύελωμα
- πάσχοντες από χρόνια σαρκοείδωση (μορφές μεγάλης βαρύτητας με πνευμονική εντόπιση)
- πάσχοντες από αυτοάνοση ηπατίτιδα
- πάσχοντες από τραυματική απώλεια και των δυο όρχεων ή αμφίπλευρη ορχεκτομή
- υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική
- πάσχοντες από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου
- πάσχοντες από διάσπαρτο ερυθματώδη λύκο ή σκληροδερμία με προσβολή των πνευμόνων (πνευμονική ίνωση, πνευμονική αγγειίτιδα), ή των νεφρών (κρεατινίνη ορού >3 ή clearance κρεατινίνης <4) ή της καρδιάς (ενδοκαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα)
- οι υποβληθέντες σε ολική ή μερική κολεκτομή